



# AGNEAUX CHETIFS - AGNEAUX FAIBLES AGNEAUX TÊTUS

## I – AGNEAUX CHETIFS – AGNEAUX FAIBLES

### Il faut :

- **Veiller à une bonne prise de colostrum.**  
(10 % du poids en 24 heures).  
(Il existe des préparations colostrales vitaminées).
- **Réhydrater et apporter de l'énergie :**
  - ➔ Glucose isotonique (5 %)  
Voie Sous-cutanée (50 ml / Kg / Jour) ou intra-péritonéal.
- **Réchauffer (lampe, bouillotte, cuisinière).**
- **Surveiller les tétées.**  
Eventuellement, utiliser une sonde pélican [[Cf. page suivante](#)].  
Débuter par de petites quantités de lait, pour éviter l'engorgement de la caillette.
- **Fortifier :**
  - ➔ **Préparation oligo-vitaminique injectable ou orale.**  
(Ex : Ipaligo® (pâte orale, présentée en seringue).

## II - AGNEAUX TÊTUS

Les agneaux têtus sont des agneaux bien portants mais qui refusent de téter. (Idem veau têtus)

Dans certaines exploitations, ces symptômes peuvent se rencontrer sur un ou plusieurs agneaux dès la première tétée.

Ceci désespère l'éleveur qui se trouve dans l'impossibilité d'allaiter des agneaux qui paraissent bien portants et qui finissent par mourir d'inanition ou des complications de fausse déglutition (pneumonie).

**L'allaitement par sonde pélican est possible**, mais représente un travail fastidieux si de nombreux agneaux sont touchés.

Dans tous les cas, l'allaitement par sonde doit débuter par de très petites quantités de lait, pour prévenir un engorgement de la caillette.

**Pour éviter ces contraintes, le traitement qui suit peut être proposé.**



### **TRAITEMENT :**

**Brotizolam à 0,02 % (Médérantil ®) : 0,5 ml IM 1 fois.**

Ce traitement est statistiquement satisfaisant et spectaculaire, dans les 10 minutes qui suivent l'injection, à condition de laisser la mère et son agneau tranquilles pendant ce laps de temps. L'éleveur peut ensuite intervenir et inciter doucement l'agneau à téter.

**NB : Prescription hors AMM, dans le cadre de la cascade.**